

Les mélanges de fleurissement

Essentiellement composés de fleurs horticoles à vocation ornementale, ces mélanges permettent, avec un investissement raisonné, d'obtenir un fleurissement varié et éclatant pour un effet particulièrement esthétique et décoratif.

Ces mélanges d'une grande diversité ont pour objectif le fleurissement de sites stratégiques de zones urbaines et péri-urbaines : parterres ornementaux, ronds

points, zones d'activités, pieds d'arbres ou de panneaux, contours de bâtiments ou zones pavillonnaires.

Les mélanges de fleurs comme solutions de fleurissement de ces zones apportent une réelle satisfaction aux habitants et aux visiteurs. La diversité des couleurs et des scènes florales sont fortement appréciées et contribuent à l'amélioration du cadre de vie de la population.



Fleurissement annuel bas

Idéal pour les petits aménagements ou les projets nécessitant de ne pas dépasser une certaine hauteur

(pieds de panneaux, pourtour d'arbres, massifs d'arbustes, ronds-points et bords de routes...).

ADONIS® Nain

Conseils & entretien

Pour avoir un résultat optimum et profiter pleinement de l'espace fleuri, il est préférable d'effectuer un semis fin mars-début avril sur un sol propre. Effectuer 1 ou 2 faux semis avant la mise en place du couvert pour nettoyer le sol des adventices qui pourraient concurrencer les fleurs. Les premières fleurs apparaîtront 6 à 8 semaines après le semis.

Fleurissement annuel bas, inférieur à 50 cm.

Période de semis : avril - mai

Dose de semis : 5 à 10 g /m²

Pérennité du couvert fleuri : 1 an

Période de floraison : de juin à octobre pour un semis d'avril.

Hauteur : inférieure à 50 cm

Composition

Nom latin	Nom commun	Couleur	Hauteur	Floraison (mois)
Fleurs				
<i>Adonis Aestivalis</i>	Adonide d'été	rouge	30 cm	juin-août
<i>Calendula Officinalis</i>	Souci	orange	40 cm	juin-octobre
<i>Centaurea Cyanus nain</i>	Bleuet des champs	bleu	40 à 50 cm	mai-septembre
<i>Eschscholtzia Californica</i>	Pavot de californie	jaune, orange	40 cm	mai-septembre
<i>Gypsophila Elegans</i>	Gypsophile	blanc	30 cm	juillet-août
<i>Iberis Umbellata</i>	Iberis en ombrelle	varié	30 cm	juin-août
<i>Linaria Maroccana</i>	Linaire	varié	30 cm	juillet-août
<i>Lobularia Maritima</i>	Lobulaire maritime	blanc	25 cm	juin-septembre
<i>Nemophila</i>	Némophile	varié	15 cm	juin-octobre
<i>Nigella Damascena</i>	Nigelle de Damas	bleu	40 cm	juin-août