



Phéromones pour la cochenille des Agrumes

Planococcus citri

Produit : Capsules à phéromones

Cible : La cochenille farineuse des agrumes *Planococcus citri*

Doses :

Capsule <i>Planococcus citri</i>	Dose	Fréquence et intervalle d'introduction
Préventif	-	-
Curatif léger	1 capsule/500m ²	A renouveler toutes les 4 à 6 semaines
Curatif lourd	-	-

Introduction

- ✓ Positionner la capsule, en évitant tout contact avec les mains, sur un panneau jaune englué du type BUG-SCAN® suspendu au-dessus de la végétation.

Conditions

- ✓ Introduction possible toute l'année.

Stockage

- ✓ Stockage possible au congélateur.

Remarque

- ✓ Lors de la mise en place de la capsule, éviter le contact avec la peau.
- ✓ Peut-être utilisé en combinaison avec les auxiliaires naturels.

Mode d'action

La capsule diffuse une phéromone reproduisant celle émise par la femelle de la cochenille *Planococcus citri*. Ce qui permet de capter le mâle ailé de cette espèce et contribuer au contrôle des populations de la cochenille.

Contrôle de succès

- ✓ Quelques jours après la mise en place, les premiers individus mâles ailés sont visibles sur les panneaux englués jaunes BUG-SCAN®.
- ✓ La prolifération de la cochenille doit devenir de moins en moins importante.